

*Hoge bloeddruk
Hoofdpijn
Oorsuizen*

**Help ons
vat te krijgen
op onze
vaten!**

FMD

Fibromusculaire Dysplasie

*Komt vaker
voor dan
je denkt!*



STICHTING FMDGROEP NEDERLAND

WWW.FMDGROEP.NL

INFO@FMDGROEP.NL



Ontwerp en drukwerk:  www.breinclame.nl


Fibromusculaire Dysplasie

Fibromusculaire Dysplasie is een aandoening die leidt tot vernauwing van bepaalde bloedvaten in het lichaam. Meestal gaat het om vernauwing van de slagaders van de nieren. Maar ook kunnen vernauwingen optreden van slagaders in de hals. Vernauwing van de slagaders in de nieren kan leiden tot hoge bloeddruk (hypertensie).

Vernauwing van de slagaders in de hals kan leiden tot een TIA (tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen) of een beroerte.

Naast vernauwingen in de nierslagaders en de halsslagaders kan fibromusculaire dysplasie soms ook andere slagaders aantasten, zoals die van het hart. FMD kan gerelateerd zijn aan een SCAD.

SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection). Bij een spontane dissectie v/d kransslagaders (SCAD) raken verschillende lagen vaatwand los van elkaar. Daardoor kan er een bloedvat afgesloten raken en een hartinfarct ontstaan.



Symptomen

Vaak zijn er geen symptomen. Als die er wel zijn zijn ze afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Bij vernauwing van de nierslagaders kunnen er symptomen optreden ten gevolge van een hoge bloeddruk. De volgende klachten kunnen dan voorkomen:

- Hoofdpijn
- Licht gevoel in het hoofd
- Gevoel van druk in het hoofd

Bij een vernauwing van een halsslagader kunnen de volgende klachten optreden:

- Hoofdpijn
- Oorsuizen synchroon met de hartslag
- Duizeligheid
- Pijn in de nek
- Dissectie (scheur in de wand van een bloedvat, meestal een slagader)
- Beroerte
- Kortstondige verlamming
- Afhangen van het bovenste ooglid en kleine pupil

Bij een vernauwing van een slagader in de buik.

- Buikpijn, vooral na het eten
- Ongewild gewichtsverlies

Bij een vernauwing van een slagader in de lies of de armen of benen.

- Pijn in voeten, onderbeen, bovenbeen
- Verschillende bloeddruk in armen en benen

Beloop en prognose

Als fibromusculaire dysplasie van de slagaderen niet wordt behandeld kunnen er verschillende complicaties ontstaan. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verhoogd. Het is daarom van belang om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Er zal dan beeldvormend onderzoek plaatsvinden.

Expertisecentrum Maastricht

Maastricht Hart & Vaatcentrum heeft een expertisecentrum voor FMD. Patiënten kunnen worden gezien op de fmd poli tijdens een spreekuur. Tevens kunnen patiënten deelnemen aan Europese registratie.

Contact met ons opnemen

STICHTING FMDGROEP NEDERLAND
kvv.nr: 68755074
info@fmdgroep.nl

Bezoek ons op internet:
www.fmdgroep.nl

